

محلول ویژه ضد عفونی پوست محل جراحی بر پایه ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین ۲٪

کاربرد: محلول ضد عفونی کننده پوست، مناسب برای آماده سازی و پرب پوست محل جراحی می باشد. انجام عمل جراحی یکی از روش های درمانی تهاجمی می باشد و عدم رعایت اصول آماده سازی پوست پیش از انجام اعمال جراحی می تواند منجر به افزایش خطر ابتلای گیرنده خدمات درمانی به عفونت های محل زخم جراحی شود. در همین راستا استفاده از ترکیبات آنتی سبتیک پایه الکی ویژه ضد عفونی پوست محل جراحی طبق دستورالعمل CDC (مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا) قبل از انجام اعمال جراحی توصیه می شود.

مزایا

- استفاده آسان و مقرون به صرفه
- سازگار با پوست و فاقد اثرات آلرژیک
- مطابقت با استانداردهای اروپایی EN1275، EN1276
- دارای ترکیب شیمیایی توصیه شده توسط CDC

تاییدیه ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. گواهی عدم ایجاد حساسیت پوستی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تست شده مطابق استاندارد EN1275، EN1276

دستور مصرف

ابتدا پوست از آلودگی واضح خارجی پاک شود. سپس سطح را با محلول درموسپت پی پلاس آغشته کنید و حداقل ۶۰ ثانیه طبق روش استاندارد مالش دهید. حداقل ۳ دقیقه زمان دهید تا کاملا خشک شود. دقت کنید که محلول بر روی محیط اطراف ناحیه عمل ریزش نکند.

ترکیبات

ایزوپروپیل الکل ۷۰٪، کلرهگزیدین گلوکونات ۲٪، ترکیبات ضد التهاب پوست

طیف اثر

موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری ها، مایکو باکتریوم ها (TbB، ...)، قارچ ها و ویروس ها HCV, HBV, HIV, H1N1

شرایط نگهداری

- دور از منابع حرارت نگهداری شود.
- در محیط خشک و دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه نگهداری شود.

موارد هشدار

- محلول آتشزا می باشد، محلول در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از تماس با قرنیه، مننژ و گوش میانی جدا خودداری گردد.
- برای کودکان زیر دو ماه بدلیل جذب و ایجاد حساسیت های پوستی استفاده نشود.
- برای بیمارانی که به کلرهگزیدین یا ایزوپروپیل الکل حساسیت دارند استفاده نشود.
- برای جراحی های نخاعی یا پونکسیون کمری استفاده نشود.
- برای زخم باز یا به عنوان شوینده معمولی مورد استفاده قرار نگیرد.
- قبل از استفاده از الکتروکوتر یا لوازم الکترونیکی در محل عمل، کاملاً خشک شود.
- از ریزش محلول در اطراف محوطه عمل جدا خودداری گردد.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از اسپری آن بر روی شعله خودداری شود.
- در صورت بلع اتفاقی به پزشک مراجعه شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- در پوش بسته نگه داشته شود.

تاریخ انقضا

۲ سال پس از تولید و در صورت باز شدن درب تا ۶ ماه

بطری ۱۰۰ میلی لیتری	بسته بندی
بطری ۵۰۰ میلی لیتری (همراه با پمپ)	

